

**PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE**

**CARBOSORB**  
**perorální prášek**  
(Carbo activatus)

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.**

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte CARBOSORB užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

**V příbalové informaci naleznete:**

1. Co je CARBOSORB a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARBOSORB užívat
3. Jak se CARBOSORB užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak CARBOSORB uchovávat
6. Další informace

**1. CO JE CARBOSORB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

CARBOSORB patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících medicínální uhlí, které pohlcuje plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí.

**CARBOSORB je určen** pro léčbu dospělých, mladistvých a dětí starších 3 let. Bez porady s lékařem mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí včetně těhotných a kojících žen a mladiství u akutních průjmů způsobených dietní chybou, při výskytu méně závažných střevních infekcí způsobených viry a bakteriemi, při dráždivém tračníku, po poradě s lékařem u akutních perorálních otrav toxickými látkami nebo předávkování perorálními léky. Dospělí, kteří trpí vředovým zánětem tlustého střeva, zánětem sliznice žaludku a nadměrným rozkladem potravy ve střevě, nebo průjmy vyvolanými v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka), mohou přípravek používat pouze na doporučení lékaře. Přípravek se používá také u diagnostického vyšetření žlučniku a žlučových cest.

Přípravek není určen pro děti do 3 let. Dětem od 3 let může být přípravek podáván pouze po doporučení lékaře.

**2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARBOSORB UŽÍVAT**

**Neužívejte CARBOSORB**

- jestliže jste přecitlivělý na složku přípravku CARBOSORB
- při nepřítomnosti zvuků ve střevech (může být zvýšené riziko ucpání střev)
- přípravek by neměl být podáván, pokud je jisté, že byly požitý leptavé látky (louhy a kyseliny),

### **Zvláštní opatření při použití přípravku CARBOSORB je zapotřebí**

Pokud trpíte:

- vředovým zánětem tlustého střeva
- zánětem sliznice žaludku
- nadměrným rozkladem potravy ve střevě
- průjmy vyvolané v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka)

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku CARBOSORB s lékařem.

### **Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky**

Účinky přípravku CARBOSORB a účinky jiných přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat.

CARBOSORB ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:

- snižuje účinky antikoncepčních přípravků užívaných ústy a proto je třeba, aby se ženy v období užívání přípravku CARBOSORB pojistily i jinou formou antikoncepce.
- snižuje vstřebávání a tím účinky jiných léčiv, proto musí být mezi užitím přípravku CARBOSORB a užíváním jiných léků dodržen interval alespoň dvou hodin.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

### **Užívání přípravku CARBOSORB s jídlem a pitím**

Přípravek se užívá rozmíchán v sklenici vody.

Doporučuje se užívat přípravek CARBOSORB 2 hodiny po jídle anebo perorálním užitím jiného léku.

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

### **Těhotenství a kojení**

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Užívání přípravku CARBOSORB během těhotenství a kojení je možné.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Přípravek CARBOSORB nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

## **3. JAK SE CARBOSORB UŽÍVA**

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

### Dávkování

Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 2 dny. Doporučené dávky jsou následující.

### **Dospělí a mladiství:**

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá denní dávka užívaná k léčbě jsou 1 - 2 polévkové lžice 3 - 4 krát denně.

### **Děti od 3 let:**

Přesné dávkování a délku léčby určí vždy lékař podle závažnosti onemocnění a věku dítěte.

Přípravek se užívá rozmíchán ve sklenici vody.

### **Jestliže jste užil(a) více přípravku CARBOSORB, než jste měl(a)**

Předávkování může způsobit mechanickou zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.

Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

## **Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CARBOSORB**

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

## **4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CARBOSORB nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Poruchy zažívací soustavy:

- snížení vstřebávání a tím účinků současně podávaných perorálních léků,
- černé zbarvení stolice, které může maskovat krvácení do trávicího ústrojí,
- vyšší dávky mohou způsobit zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

## **5. JAK CARBOSORB UCHOVÁVAT**

Uchovávat při teplotě do 25 °C.

Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte CARBOSORB po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. DALŠÍ INFORMACE**

### **Co přípravek CARBOSORB obsahuje**

Léčivou látkou je carbo activatus 25 g v jednom balení.

Přípravek neobsahuje další pomocné látky.

### **Jak přípravek CARBOSORB vypadá a co obsahuje toto balení**

Perorální prášek - jemný černý prášek bez hrubších hrudkovitých částí, špatně rozpustný ve všech obvyklých rozpouštědlech.

Balení obsahuje 1x25 g prášku.

### **Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce**

IMUNA PHARM, a.s

Jarková 17

082 22 Šarišské Michaľany

Slovenská republika

### **Tato příbalová informace byla naposledy schválena**

13.4. 2011