

sp.zn.sukls86012/2024

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

### NÁZEV PŘÍPRAVKU URCYSTON PLANTA

Léčivý čaj  
Perorální podání  
Choroby močových cest

### SLOŽENÍ

Uvae ursi folium 0,375 g (medvědicový list), Equiseti herba 0,300 g (přesličková nať), Myrtilli herba 0,225 g (borůvková nať), Matricariae flos 0,150 g (heřmánkový květ), Sambuci nigrae flos 0,150 g, (květ černého bezu), Solidaginis herba 0,150 g (zlatobýlová nať), Thymi herba 0,150 g (tymiánová nať) v 1 nálevovém sáčku.

### POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při akutních infekčních chorobách močových cest, které se projevují pálením při močení a častým močením. Působí močopudně, antisepticky (protibakteriálně), uvolňuje křeče hladkého svalstva.

Desinfekční účinek medvědice lékařské (*Uvae ursi folium*) je vhodně doplněn dalšími léčivými rostlinami, které zvyšují tento účinek a působí příznivě při onemocněních močových cest.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

### PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

1 nálevový sáček se přelije šálkem (¼ l) vařící vody a po 10 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjme. Ke zvýšení účinku se doporučuje přidat k nálevu na špičku nože zaživací sodu. Čaj se pije teplý 3-5x denně. Přípravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek se obvykle používá 1-2 týdny, pokud lékař neurčí jinak.

Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají déle než 1 týden, poraďte se s lékařem.

Léčbu je možno opakovat nejvýše 5 krát za rok.

### KONTRAINDIKACE

Neužívejte při otocích způsobených nedostatečnou funkcí srdce a ledvin, při přecitlivělosti na některou složku přípravku. Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy.

Nepodávejte dětem do 12 let.

### NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U citlivých osob může vyvolávat žaludeční obtíže nebo alergické kožní reakce, které po vysazení přípravku vymizí.

#### Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

[www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek).

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

### **INTERAKCE**

Neužívejte s léky a potravou snižující pH moči (zvyšující kyselost moči) např. kyselé šťávy.

### **UPOZORNĚNÍ**

Přípravek může způsobovat hnědé zbarvení moči.

Ošetřujícího lékaře informujte, že užíváte Urcyston Planta.

Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví krev nebo hnis v moči, bolest v podbřišku nebo horečka, poraďte se s lékařem.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### **UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

### **VELIKOST BALENÍ**

20 nálevových sáčků po 1,5 g

Hmotnost náplně 30,0 g

### **REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

94/133/89-C

### **Č.šarže**

### **POUŽITELNÉ DO**

### **DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470

156 15 Praha 5 - Zbraslav

Česká republika

e-mail: [leros@leros.cz](mailto:leros@leros.cz)

### **VÝROBCE:**

LEROS, s.r.o.

B. Hrejsové 1301

696 62 Strážnice

### **INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU**

urcyston

### **DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU**

2. 5. 2024